

## ট্রেস

জাত :- ভি.অর.ও-৬, আর্ক অনামিকা, হাইব্রিট- ১০

বীজ বোনার সময় :- ফাগুন- শ্রাবণ মাস।

কানি প্রতি বীজের পরিমাণ :- ১.২৫- ১.৫ কেজি।

জমি তৈরি :- ২-৩ বার ভাল করে চাষ এবং মই দিয়ে মাটি ঝুরে ঝুরে করে নিন। এই সময় আগাছা ভাল করে পরিষ্কার করুন এবং জল নিকাশের ব্যবস্থা রাখুন।

কানি প্রতি সারের পরিমাণ এবং সার প্রয়োগের সময় :-

গোবর সার বা খামার পাঁচ সার - ৪০০০ কেজি,

ইউরিয়া - ৩৫ কেজি,

সুপার ফসফেট - ৪৮ কেজি,

পটাশ - ১৩ কেজি

পি.এস.বি. ও অ্যাজোটোব্যাকটর২ কেজি করে

প্রথম চাষে গোবর সার বা খামার পাঁচ সার ভাল করে মিশিয়ে দিন। উভয় রূপে শুকনো গোবর বা কেঁচোসারের সাথে ইউরিয়া, সুপার ফসফেট এবং পটাশ মিশিয়ে নিন। এই মিশনের অর্ধেক পরিমাণ মূল জমি তৈরী করার সময় দিন এবং বাকি পরিমাণ ২০-২৫ দিন পর চাপান হিসাবে গাছের গোড়া থেকে একটু দূরে প্রয়োগ করুন।

দূরত্ব :- সারি

থেক্সোরি ৪৫ সেমি এবং গাছ থেকে গোড়াছে ২৫ সেমি দূরত্ব বজায় রাখুন

লাগাবার নিয়ম :- ৪৫সেমি. অন্তর লাইনে বীজ বুনুন। প্রতি ১০- ১২ লাইন একটি হালকা গভীর নালার ব্যবস্থা করতে হবে যেখানে প্রয়োজন সেচ দেওয়া এবং অতিরিক্ত জল বাহির করে দেওয়ার ব্যবস্থা করুন।

আন্তর্বর্তী পরিচর্যা :- আগাছা পরিষ্কার করুন, গাছের সংখা নিয়ন্ত্রণ এবং দুই বারে গাছের গোরায় মাটি তোলেন্দিন। প্রথম বার ২০-২৫ দিনে এবং দ্বিতীয় বার ৩০-৩৫ দিনে।

সময় কাল :- ৮০- ১০০ দিন।

কানি প্রতি উৎপাদন :- ১৫-২০কুইন্টল প্রতি কানি।