

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳ

ಬೇಸಾಯ ಕ್ರಮಗಳು: ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮೊದಲು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್‌ನ್ನು ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು 60 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದ ನಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 5 ಸೆಂ.ಮೀಗಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಿರದಿಂತೆ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಬೇಕು.

ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ

1. ಮುಂಗಾರು	ಮೇ-ಜುಲೈ,	2. ಹಿಂಗಾರು	ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್
3. ಬೇಸಿಗೆ	ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ		

ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು	ನೀರಾವರಿಗೆ	ಖಟ್ಟಿ ಬೇಳಿಗೆ
ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ	5 ಕೆ.ಜಿ.	6 ಕೆ.ಜಿ
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್	4 ಟನ್	4 ಟನ್
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ		
ಸಾರಜನಕ	60 ಕೆ.ಜಿ.	40 ಕೆ.ಜಿ
ರಂಜಕ	30 ಕೆ.ಜಿ	20 ಕೆ.ಜಿ
ಹೊಟ್ಟಾಷ್ಟ್	16 ಕೆ.ಜಿ	10 ಕೆ.ಜಿ
ಸತ್ಯವಿನ ಸಲ್ಟೇಚ್	4 ಕೆ.ಜಿ.	4 ಕೆ.ಜಿ

ಮಣ್ಣ ಪರಿಶ್ಲೇಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಸ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶಿಥಾರಸ್ಸು ವಾಡಿದ ಅರ್ಥಭಾಗ ಸಾರಜನಕ ಹೊಟ್ಟಿ ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟಾಷ್ಟ್‌ನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಉಳಿದ ಅರ್ಥಭಾಗ ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಏರಡು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 25% ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 3-4 ವಾರಗಳ ನಂತರ (2 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಬೇಳಿದಾಗಿ) ಮತ್ತು ಉಳಿದ 25% ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು 6-7 ವಾರಗಳ (ತುರಾಯಿ ಬರುವ ಸಮಯ) ನಂತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಸಿಥಾರಸ್ಸು ಮಡಿರುವ ಸತ್ಯವಿನ ಸಲ್ಟೇಚ್ ಅನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಸಿಯಿಂದ 7.5 ರಿಂದ 10 ಸೆಂ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸಸಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕುವಾಗ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು.

ಅಂತರ ಬೇಸಾಯ: ಮೊದಲ ಕಂತಿನ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಪ್ಪು ಕುಂಟೆ ಮತ್ತು ಎಡ ಕುಂಟೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರಗಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗಲೇ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಏರಡನೆಯ ಕಂತಿನ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಟ್ಟಿ ನಂತರ ಮಣ್ಣ ಏರು ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಕ್ಲೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಕಾಟು ಕಟ್ಟಿವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುದಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮುರಿಯಬಾರದು. ಹಿಂಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸದ್ಯದ ಕಾಟು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಮತ್ತು ಬೇಳೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುವಾಗ ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡುವುದು ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಅಧ್ಯರಿಂದ ಬಿತ್ತನೆಯಾದ 24 ಗಂಟೆಗಳೊಳಗೆ ಮರಳು ಭೂಮಿಯಾದಲ್ಲಿ 1.2 ಕೆ.ಜಿ. ಅಂತಾಚಿನ ಅಥವಾ ಸಿಮಾಚಿನ್ ಕಳೆ ನಾಶಕವನ್ನು 300 ಲೀ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು. ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಮಣ್ಣನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೆಂಟೆಗಳಿರದಂತೆ ಎಚ್ಚರವಹಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ಒಂದು ಸಾರಿ ಕ್ಯಾಯಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ 40 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ನಂತರ ಕಳೆಗಳು ಒಂದರೂ ಇಳುವರಿ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ.

ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕ್ರಮಗಳು: ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರೆ ಕೀಟಗಳಿಗಿರುವ ಕೆಲವು ಮುಂಜಾಗ್ರಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

- ರೋಗ ರಹಿತ ಬೇಳೆಯಿಂದ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಆರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಳಸುವುದು.
- ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಸೆರ್ವಾನ್ ಶಿಲೀಂದ್ರ ನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

ಕಾಂಡಕೊರಕ ಕೀಟ:

ಇದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಡಕೊರಕದ ಪರಂಗಗಳು ಹೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟ 2 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮರಿಗಳು ಹೊರಬಿಂದು ಗಿಡದ ಸುಳಿಯಿಂದ ಸುರುಳಿಯೊಳಗೆ ನುಸುಳಿ ತಿಂದು ಹಾನಿ ಮಾಡಿ, ಹಿಕ್ಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ. ಬಾಧೆಗೊಳಗಾದ ಗಿಡದ ಸುಳಿಭಾಗದ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ರಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬಾಧೆ ಅತಿಯಾದಾಗ ಸುಳಿಯು ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 3 ರಿಂದ 4 ಮರಿಹುಳಿಗಳು ಇದ್ದು, ಬೇಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಿಸಿ

ಕಾಂಡಮೋಳಗೆ ಕೋಶಾವಸ್ತೇಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ಕೋಶಾವಸ್ತೇಗೆ ಮುನ್ನ ಕಾಂಡದ ಬುಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಂದ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಕೋಶವನ್ನು ಸೀಳಿಕೊಂಡು ಪ್ರೌಡ ಪತಂಗವು ಹೊರ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು:

ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಣಿನ್ನು ಆಗಾಗೆ ಏರಿಸುತ್ತಿರಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೇಟವು ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಕೋಶಾವಸ್ತೇ ಹೊಂದಿ ಪತಂಗಗಳು ಹೊರಬರದೇ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಸಸಿಗಳು ಎಳೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಸುಳಿಗಳಿಗೆ ಚೈಷಧಿ ಸಿಂಪರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸಿಂಪರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀ. ನೀರಿಗೆ 2 ಮಿ.ಲೀ ಕ್ಷೇತ್ರಾರ್ಥಾಸ್ 25 ಇ.ಸಿ.ಅಥವಾ ಸಿಂಪರಣೆಯು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಳಿಯೋಳಿಗೆ ಕಾರ್ಬರಿಲ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಗಿಡದ ಬುಡಕ್ಕೆ ಮಣಿನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏರಿಸಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಕೋಶಾವಸ್ತೇಗೆ ಹೋಗುವ ಕೇಟದ ಮರಿಯ ಪತಂಗವು ಹೊರಬರಲು ಆಗದೆ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಅದಲ್ಲದೇ ಪಕ್ಕದ ತೆಂಡೆಗಳಿಗೂ ಹರಡದರಂತೆ ಹಾಯಿಯನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು:

ಬೊಜುರೋಗ ಅಥವಾ ಕೇದಿಗೆ ರೋಗ :

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಾನಿ ಕಾರಕ ರೋಗವೆಂದರೆ ಕೇದಿಗೆ ರೋಗ. ಇದು ಬೆಳೆಯು 20 ರಿಂದ 25 ದಿನಗಳ ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವಾಗ ರೋಗದ ಚಿನ್ಹಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಲೀಂದ್ರದಿಂದ ಹರಡುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು, ಎಲೆಯ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಮತ್ತು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿಯಂತಹ ಬೊಜು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬಾಧೆ ರೋಗವು ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರಗೂಂಡಾಗ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಉದ್ದನೆಯ ಪಟ್ಟಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂರಿತವಾಗಿ ಅಂತಹ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ತನೆಗಳು ಬರುವುದಿಲ್ಲ.

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು:

- ಮಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬೇಕು
- ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಬೊಜು ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಬೆಳೆ ಇಡೆ ಹರಡೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಶಿಫಾರಸ್ನು ಮಾಡಿರುವ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.
- ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ತಗುಲಿದ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಿತ್ತು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸುಟ್ಟು ನಾಶಪಡಿಸಬೇಕು.
- ಪ್ರತಿ ಕೆ.ಜಿ. ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾ. ಮೆಟಲಾಸ್ಟ್‌ಲ್ ಎಂ.ಜೆಡ್‌ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮೊಳಕೆಯಾದ 10-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ರೋಗಭಾದೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೆಟಲಾಸ್ಟ್‌ಲ್ ಎಂ.ಜೆಡ್ ಅನ್ನು 1 ಲೀ.ಗೆ 2 ಗ್ರಾ ನಂತೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.

ಎಲೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗ:

ಇದು ಶಿಲೀಂದ್ರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರೋಗವಾಗಿದ್ದು ಹಿಂಗಾರು ಹಂಗಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಯು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗವು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ರೋಗವು 25 ರಿಂದ 30 ದಿವಸಗಳ ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ತಗುಲಿದಾಗ ಅವು ಒಣಿಗಿ ಸಾಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಬಲೀತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ರೋಗ ಬಂದಾಗ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಲಾಳಿಯಾಕಾರದ ಬೊದು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂಡು ಬಣ್ಣದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕೂಡಿ ಎಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲಾ ಅವರಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿದರೆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾದಾಗ ಕಾಳಿನ ಇಳಿವರಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ 50 ರಪ್ಪು ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹತೋಟಿ ಕ್ರಮಗಳು:

- ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಯನ್ನು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ, ಕಾರಣ ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ಬೆಳೆಗೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ
- ಶಿಫಾರಸ್ನು ಮಾಡಿದ ಕಾಲ ಹಾಗೂ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕು
- ತಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬದುಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಯುವ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಸ್ವಚ್ಚವಾಗಿಡುವುದರಿಂದ ಈ ಶಿಲೀಂದ್ರದ ಸಂತತಿ ವೃಧಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ
- ಬೆಳೆ ಇರುವ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ನೀರು ನಿಲ್ಲಿದಂತೆ ಬಸಿ ಕಾಳುವೆ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಾದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು
- ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡ ತಕ್ಕಣ 2.5 ಗ್ರಾ ಮ್ಯಾಂಕೆಬೆಚ್ ಶಿಲೀಂದ್ರನಾಶಕವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಲೇಟರ್ ನೀರಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ 35, 45 ಮತ್ತು 55 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಬೇಕು.
- ರೋಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಪದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ ಎನ್.ಎ.ಸಿ-6002, ಎನ್.ಎ.ಸಿ-6004, ಎನ್.ಎ.ಹೆಚ್-2049(ನಿತ್ಯಶ್ರೀ) ಮತ್ತು ಎನ್.ಎ.ಹೆಚ್-1137(ಹೇಮ) ಬೆಳೆಯಬಹುದು.