

7. ಹೊಕೋಸು (ಕಾಲಿಫ್ಲಾವರ್)

ಹೊಕೋಸು (ಕಾಲಿ ಫ್ಲಾವರ್) ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ‘ಸಿ’ ಅನ್ನಾಂಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣ : ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಮಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀರು ಬಿಸಿದು ಹೋಗುವಂತಹ ಫಲವತ್ತಾದ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಗೋಡು ಮಣ್ಣ ಅಥವಾ ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣ ಉತ್ತಮ. ಸವಳು ಮಣ್ಣಿನ ವಿದ್ಯುದ್ಭವತ್ತ 4 ರಿಂದ 5 ಡಿ.ಸ್ವೀ.ಮೀ. ಇರುವಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ಹುಳಿ ಮಣ್ಣಿನ್ನು ಮತ್ತು ಜೋಗು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಈ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮವಲ್ಲ.

ಬಿತ್ತನೆ ಕಾಲ : ಈ ಬೆಳೆಗೆ ತಂಪಾದ ಹವಾಗುಣ ಬೇಕು. ಉಪಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾದಲ್ಲಿ ಹೊಕೋಸು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಾವದಿಗಾಗೂ ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್-ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಿ ತಳಿಗಳನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ತಳಿಗಳು

- ಅಲ್ರೆ ಸ್ಮೌಬಾಲ್** ಇದು 60 ರಿಂದ 80 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಗೆ ಬರುವ ತಳಿಯಾಗಿದೆ. ಹೊಕೋಸುಗಳು ಒತ್ತಾಗಿದ್ದು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿರುತ್ತವೆ.
- ಸ್ಮೌಬಾಲ್** ಇದು ಮಧ್ಯಮಾವಧಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, 80 ರಿಂದ 100 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಯಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯ ಹೊಕೋಸುಗಳು ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದಾಗಿವೆ.
- ಲೇಟ್ ಸ್ಮೌಬಾಲ್** ಇದು ದೀಪಾಲಿ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, (100 ರಿಂದ 120 ದಿನಗಳು) ಹೊಕೋಸು ಒತ್ತಾಗಿದ್ದು ಒಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಬೇಸಾಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ.	ವಿವರಗಳು	ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೀರಿಗೆ
1.	ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ	200-250 ಗ್ರಾಂ
2.	ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	25 ಟನ್
3.	ಸಾರಜನಕ	150 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
4.	ರಂಜಕ	100 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ
5.	ಪೊಟ್‌ಪ್ರಾಷ್	125 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ

ಸಿ ಮಡಿ ತಯಾರಿಕೆ : ಒಂದು ಹೆಚ್ಚೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು 7.5 ಮೀ ಉದ್ದ 1.2 ಮೀ ಆಗಲ ಮತ್ತು 15 ಸೆ. ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಸಸಿಮಡಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಮಡಿಗೂ 25 ರಿಂದ 30 ಕಿ. ಗ್ರಾಂ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಕಿ. ಗ್ರಾಂ 15:15:15 ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ. ಬಿತ್ತುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೀರಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜವನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಾನ್ ರಾಸಾಯನಿಕದಲ್ಲಿ 1.5 ಲೀಟರ್‌ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದ ದ್ರಾವಣದಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ದಿ ತೆಗೆದು ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಿಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. 7.5 ಸೆ. ಮೀ. ಅಂತರದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬೀತ್ತಿ, ಬೀಜದ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾಗಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು. ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಬೀಜಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವವರಿಗೆ ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಬಣ ಹುಲ್ಲಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ದಿನ ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಈ ತರಹ ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು 21 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ.

ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದು : ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹದಮಾಡಿದ ನಂತರ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ಅಲ್ಲಾವದಿಗಾಗಿ 45 ಸೆ. ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾಲಿ ತಳಿಗಳಾದಲ್ಲಿ 60 ಸೆ. ಮೀ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ, ಹರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕ ಮತ್ತು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದ ರಂಜಕ, ಪೊಟ್‌ಪ್ರಾಷ್ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭೂಮಿಗೆ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 3-4 ದಿನಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಯಿಸಬೇಕು. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 4 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಸಾರಜನಕವನ್ನು ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕೆಳರಹಿತವಾಗಿಡಬೇಕು. ಹೊವಿನ ಚೆಂಡು ಬೆಳೆಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊವನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಆಕಷ್ಣಕ ಬಿಳಿ ಬಣಿದ ಹೊಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ.

ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ : ಎಲೆಕ್ಟೋಸಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೇ ಈ ಬೆಳೆಗೂ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.

ಇಂದ್ರಾಜಿತ್ ಹೆಚ್

ಪ್ರತಿ ಹೆಚ್ಚೇರಿಗೆ

ಅಲ್ಲಾವದಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮಾವದಿ ತಳಿಗಳು 15 ರಿಂದ 20 ಟನ್

15 ଦିନ 20 ଟଙ୍କା

ଦୀର୍ଘାବନ୍ଧ ତଳିଗଲୁ

20 ଠିଙ୍କ 25 ଟଙ୍କା

ମୋହନେ : ବୀଜଗଳନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣୀକିତିରେ ସଂସ୍ଥଗଳିଠିରେ ମାତ୍ର ପଡ଼େଯବେକୁ. ବେଳେଯନ୍ତୁ ହେଚ୍ଛୁ ପ୍ରଦେଶରେ ବେଳେଯିବାଙ୍ଗିଧରେ ଭଦ୍ରପଦିଷିଦ ଡ୍ସବ୍ଗଳଟିରୁବ ଶ୍ରୀଘାରସ୍ତ୍ର ମାତ୍ରିଦ ତଳାଗଳ ବୀଜଗଳନ୍ତୁ ଉପଯୋଗିବାବେକୁ. କଳପେ ବୀଜଦିଠିର ବେଳେ ସରିଯାଗି ବରୁଵାଦିଲୁ.